


Programa de Vid



CUADRO RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	OBJETIVO	RECOMENDACIÓN
Vid de mesa	Preventivo: 4 kg/ha	Palo negro, bayas acuosas y racimos débiles . Mejorar calidad y condición de post-cosecha	2 a 4 aplicaciones durante crecimiento de bayas hasta inicio de pinta.
	Curativo: 6 kg/ha		2 a 4 aplicaciones desde inicio de pinta hasta frenar los síntomas.

RECOMENDACIONES PARA UNA FERTILIZACIÓN EXITOSA

- Aplicar durante las primeras horas y últimas horas del día con temperaturas templadas para evitar evapotranspiración y aprovechar la apertura de estomas.
- Utilizar entre 4 - 6 kg por hectárea tomando en cuenta la variedad, la carga y patrón del viñedo.
- En etapas críticas dónde predominan factores abióticos que perjudican la fotosíntesis y promueven el incremento de nitrógeno amoniacal acortar los periodos de aplicación para nivelar los niveles de nitrógeno amoniacal dentro de la planta.
- Al tener problemas ya visibles (baya acuosa, palo negro) usar dosis no menor de 6 kg, teniendo en cuenta que actúa como cicatrizante de micro fisuras y detiene problemas ya establecidos.